Pommiers

Stades phénologiques / BBCH	Maladies / Ravageurs	Produits	Volume des arbres 10'000 m³ %	Volume des arbres 10'000 m³ Base 1600 l/ha	Remarques
B / 51 Débourrement	Tavelure	**Flowbrix** Nouveau	0,125 %	2-4 l/ha	Produit cuprique de haute qualité.
	Pou San José, acariens rouges, eriophyides, cochenilles	**Spray-Oil 7 E**	3,5 %	56 l/ha	Respecter un délai de 4 à 6 jours avant l'application d'un nouveau fongicide.
	Pucerons, cheimatobies, tordeuses des bourgeons, psylles du pommier	**Oléo Diazinon R**	0,5 %	8 l/ha	
C³ / 53 Oreilles de souris	Tavelure	**Delan**	0,05 %	0,8 kg/ha	Temp. min. pour une bonne efficacité: 15°C
	Bostryche/anthonome	**Endosulfan**	0,15 %	2,4 l/ha	
	anthonome	**Pyrinex**	0,15 %	2,4 l/ha	
D / 56 Boutons verts	Tavelure/oïdium	**Delan**	0,05 %	0,8 kg/ha	Agit également très bien par temps froid.
		+ Soufre mouillable	0,4 %	6,4 kg/ha	
	Acariens rouges et jaunes	**Matacar**	0,05 %	0,8 kg/ha	Sur oeufs d'hiver d'acariens rouges Matacar, Trévi, Apollo 1x par saison max.
	Pollinisation (cultures arboricoles sous filets)	**Tripol**			3-5 unités par ha (demander consultation)
E / 57 Boutons rouges	Tavelure/oïdium et moniliose	**Colt Elite**	0,1-0,15 %	1,6-2,4 kg/ha	Produit pénétrant ou systémique / Max. 4 applications par année.
	Tordeuses de la pelure, noctuelles, cheimatobies	**Rimon** Nouveau	0,06 %	0,96 l/ha	Distance min. de 40 m des eaux de surfaces.
	Pucerons	**Pirimor**	0,04 %	0,64 kg/ha	
	Cheimatobie, capua	**Pyrinex**	0,15 %	2,4 l/ha	Faucher l'herbe en fleurs avant
	Cheimatobie, noctuelle, cacoecia, pucerons, capua	**Diazinon**	0,1 %	1,6 l/ha	l'application d'insecticides.
	Apport manganèse	**MaxMan 400**	0,05 %	0,8 l/ha	
	Apport bore	**Micro-Bor**	0,1 %	1,6 l/ha	
F / 67	Tavelure/oïdium + moniliose	**Colt Elite**	0,1-0,15 %	1,6-2,4 kg/ha	Uniquement une application annuelle. En fin de floraison. Ajouter 0,05 % de Mouillant LG pour en renforcer l'efficacité. Traiter par temps chaud et humide (min. 14°C). Consulter le mode d'emploi.
	Pourriture de l'oeil	**Carbendazime**	0,1 %	1,6 kg/ha	
	Eclairissage chimique	**Phytonic**	7,5 à 20 g/100 l		
		Ethephon	0,03 %	0,3 l/ha	
G-H / 67-69 Post-floral	Cécidomyie, pucerons, hoplocampes	**Diazinon**	0,1 %	1,6 l/ha	Traitement sitôt après la fleur.
	Tavelure/oïdium	**Stroby**	0,0125 %	200 g/ha	
	Hoplocampes	**Pyrinex**	0,15 %	2,4 l/ha	Directement après la fleur.
I / 71 Fruits env. 1 cm de diamètre	Tavelure/oïdium	**Stroby**	0,0125 %	200 g/ha	Maximum 4 traitements par année
	Carpocapse, tordeuses de la pelure, mineuses	**Rimon** Nouveau	0,06 %	0,96 l/ha	Distance min. de 40 m des eaux de surfaces. Délai d'attene: 3 semaines.
	Pucerons lanigères et autres pucerons	**Pirimor**	0,04 %	0,64 kg/ha	Répéter après 3-4 semaines si nécessaire
	Apports précoces calcium	**Basfoliar-Combi STIPP**	0,15 %	2,4 l/ha	3-4 fois en mélange jusqu'à fin juin.
 **J / 73** Juin	Tavelure/oïdium	**Stroby**	0,0125 %	200 g/ha	Ne pas mélanger Captane avec du Soufre LG sur les variétés du groupe Starking (Red delicious, Kidd's, Cox orange...)
		ou Captane WDG	0,15 %	2,4 kg/ha	
		+ Soufre mouillable	0,2 %	3,2 kg	
	Capua, carpocapse, PSJ	**Pyrinex**	0,15 %	2,4 l/ha	Traitements selon les instances officielles. Efficacité constante et durable.
	Chute précoce des feuilles	**Folifert Super**	0,2 %	3,2 kg/ha	3 traitements jusqu'à fin juin.
Juillet	Tavelure/oïdium	**Captane WDG**	0,15 %	2,4 kg/ha	
		+ Soufre mouillable	0,2 %	3,2 kg/ha	
	Carpocapse	**Pyrinex**	0,15 %	2,4 l/ha	Délai d'attente: 3 semaines.
Juillet – août	Tavelure/maladies de conservation	**Folpet 80 WDG**	0,1 %	1,6 kg/ha	Pas d'application de folpet sur poiriers.
		+ Mouillant LG	0,05 %	0,8 l/ha	Ne pas mélanger folpet avec du soufre sur les variétés du groupe Starking.
Bitter-pit		**Tip calcium**		8 l/ha	5–8 applications. Miscible avec les produits antiparasitaires usuels
Chute prématurée		**Phytonic**		10 g/100 l	Traitements 5 et 3 semaines avant la récolte présumée. Ajouter 0,05% de Mouillant LG
Dégâts de grêle		**Folpet 80 WDG**	0,125 %	2 kg/ha	Traiter rapidement après la grêle.
	Observation de l'attaque des cheimatobies.	**Collier anti-chenilles**			Dès mi-octobre pour arbres isolés.

= Produits conformes aux normes PER (prestations écologiques requises).Observer les directives cantonales ou du contractant.